



Készült a Fogorvos Kollegiális Szakmai Vezetők és
a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
együttműködésében.

CARIES-INTENZITÁS (CARIES-PREVALENCIA) MÉRÉSE A LAKOSSÁG KÖRÉBEN

(Tájékoztató és kitöltési segédlet az alapellátásban dolgozó
fogorvosok számára)

EPIDEMIOLOGIA

Epidemiológiai alapfogalmak:

Caries-intenzitás: egy adott időpontban a vizsgálati egységben a megbetegedett fogak/felszínek száma.

Caries-frekvencia (prevalencia, gyakoriság): a szuvas fogú személyek száma a vizsgált személyek számához viszonyítva, %-ban kifejezve.

A civilizált országokban a caries frekvenciája 95-100 %.

Az első carieses léziók a tejfogakon már a 2. évben megjelennek, és 6 éves korban már a maradó fogak is kezdenek szuvasodni. 13-20 életév között a DMF-T eléri a 10-et.

A fogeltávolítások fő oka a 35-40. életévig a caries.

A DMF- SZÁM ÉS- INDEX

A caries regisztrálására a DMF-számot/ indexet használjuk.

Az egyénre számolt értéket számnak, míg a csoportra számított értéket indexnek nevezük.

A DMF a szuvas (decayed), hiányzó (missing) és tömött (filled) kifejezések angol megfelelőjének kezdőbetűiből áll össze.

A **DMF-T szám** egy adott páciens szuvas, hiányzó és tömött fogainak összegét jelöli.

A **DMF-T index** a szuvas fogak számának átlagát jelöli egy adott populációban.

MÓDSZERTANI ELVEK

A számokat mindig 28 maradó-, valamint 20 tejfogra számoljuk, nem vesszük figyelembe a bölcsességfogakat.

A DMF-T szám megmutatja:

- hány fog szuvas (decayed – D, d),
- hány fog hiányzik (missing – M, m),
- hány fog tömött/restaurált (filled – F, f).

A fentiek összege adja a DMF-T/dmf-t számot.

A DMF-T KISZÁMÍTÁSA (MARADÓ FOGAZATBAN)

Szuvas elváltozás(ok), illetve szuvas elváltozás(ok) és restauráció esetén a fogat D-nek jelöljük.

Ha a fogszuvasodás miatt extrahálták a fogat, akkor M-ként kell rögzíteni.

Ha a fog tömött, vagy a tömés javításra szorul, de nem szuvas, akkor ezt F-nek kell tekinteni.

A trauma következtében koronával helyreállított fogak elvileg nem tartoznak bele a felsorolásba, de ez nem biztos, hogy az anamnéziséből kideríthető.

Fogak más okból is hiányozhatnak (csírahiány, trauma, parodontális betegség, orthodontiai okok, elő nem tört fogak, a veleszületetten hiányzó fogak), lehetnek számfeletti fogak, és a perzisztáló tejfogak - ezekkel a DMF-T számítás során nem foglalkozunk.

DMF-T értéke 0 és 28 között van.

A dmf-t KISZÁMÍTÁSA (TEJFOGAZATBAN)

A dmf-t esetében a d, m és f rögzítésére vonatkozó szabályok megegyeznek a DMF-T-vel.

A **dmf-t szám** az érintett fogak számát fejezi ki a tejfogazatban a pontszám 0 és 20 között van.

CARIESINTENZITÁS (CARIES PREVALENCIA) MÉRÉSE A LAKOSSÁG KÖRÉBEN

Fogászati praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek
(DMF-T; dmf-t szám felvétele és rögzítése)

Név	
TAJ	
Születési idő	
Életkor	
Vizsgálatot végző neve	
Vizsgálat dátuma	

Az emelt szintű fogorvosi praxisközösségben a DMF-T, illetve dmf-t számot rögzítjük!
Töltse ki a táblázatot! Tömött, szuvas, cariológiai okból hiányzó foghoz írjon 1-est!
Cariológiailag ép foghoz írjon 0-t! Adja össze a számokat!
 (DMF-T maximum 28, dmf-t maximum 20 lehet.)

DMF-T

17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37

dmf-t

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

A kérdőív nem validált, eredménye csak tájékoztató jellegű.

DMF-T/dmf-t szám:	
--------------------------	--